

**MAKEI 2005: Nachsorge und Diagnostik von Spätfolgen  
Teratome Grad 0-3 ohne Microfoci (favorable risk)**

**Patient:** \_\_\_\_\_ **Geb:** \_\_\_\_\_

	Therapieende	nach Therapieende					
	Datum __ . __ . 20__	1. Jahr 20__	2. Jahr 20__	3. Jahr 20__	4. Jahr 20__	5. Jahr 20__	- 10. Jahr - 20__
<b>Rezidivdiagnostik</b>							
allgemeine körperliche Unters., Lokalbefund	1-malig	3 mtl.	3 mtl.	6 mtl.	6 mtl.	6 mtl.	jährlich
Blutbild	1-malig	-	-	-	-	-	-
AFP / $\beta$ -HCG	1-malig	3 mtl.	3 mtl.	6 mtl.	6 mtl.	6 mtl.	jährlich
CT/MRT/ Sonographie der prim. Tumorlokalisation <sup>1</sup>	1-malig	3 mtl.	3 mtl.	6 mtl.	jährlich	jährlich	jährlich
<b>Verlaufs- und Spätfolgendagnostik</b>							
allgem. Blutentnahme <sup>2</sup> / Urinuntersuchung <sup>2</sup>	1-malig		-	-	-	-	-
Virusserologie <sup>3</sup> / Impftiter <sup>4</sup>	1-malig		-	-	-	-	-
Blutentnahme-Endokrinologie <sup>5</sup>	1-malig	Bei Auffälligkeiten in der Pubertätsentwicklung					
Perzentilen <sup>6</sup>	1-malig	jährlich	jährlich	jährlich	jährlich	jährlich	jährlich
Tannerstadien/Hodenvol.	1-malig	6 mtl.	6 mtl.	jährlich	jährlich	jährlich	jährlich
Spermiogramm		Bei Auffälligkeiten in der Pubertätsentwicklung					
Lebensqualität	1-malig	-	1-malig	-	-	1-malig	-
<b>metachrone Erkrankungen</b>							
Zwischen 2. bis 10. Jahr nach Diagnose (insbesondere Ovar)							
<b>Zweitmalignome</b>							

<sup>1</sup> bei Steissbeintumoren MRT zum Therapieende in 3 Ebenen

<sup>2</sup> **allgemeine Blutentnahme:** Bili, Harnstoff, Harnsäure, Kreatinin, GOT, GPT,  $\square$ -GT, AP, LDH, Phosphat, Magnesium, Na, K, Calcium, Kreatinin, .

**Urinuntersuchung:** Urinstatus, Eiweiß, Glucose, Phosphat, Kreatinin, Calcium.

<sup>3</sup> **Virusserologie:** Virus- und Antikörper-Nachweis für HBV, HCV, HIV, CMV, EBV.

<sup>4</sup> **Impfungen:** gemäß STIKO-Empfehlungen.

<sup>5</sup> **Blutentnahme-Endokrinologie: Sexualhormone:** 1-malig oder bei pathol. Befund in der Pubertätsentwicklung o. den Perzentilen LH, FSH, Prolaktin, bei Jungen zusätzlich Testosteron, bei Mädchen Östradiol (cave Zyklusabhängigkeit), ggf. Stimulationstests.

<sup>6</sup> . Röntgen-Linke-Hand zur Knochenalterbestimmung bei Auffälligkeiten.